

Upute za pripremu prije testa na okultno krvarenje u stolici

- 7 dana prije testa ne preporučuje se uzimati lijekove koji mogu dovesti do krvarenja u probavnom sustavu i pojave krvi u stolici (aspirin, indometacin, fenilbutazon, rezerpin, kortikosteroidi i dr.)
- test treba odgoditi 3 dana prije i poslije menstruacije, kao i kod krvarenja zbog zatvora, hemeoroida, krvi u mokraći ili rektalne primjene lijekova
- preporučuje se analizirati tri uzastopne stolice kroz tri dana i to po tri uzorka s različitih mjesta iz svake stolice
- uzorak stolice je stabilan 24 sata u hladnjaku

Test koristi imunokemijsku metodu:

- nije potreban poseban način prehrane prije uzimanja uzoraka jer ne podliježe interferencijama

Literatura:

1. WHO, Fact sheet No297, Feb. 2009
2. Hundt S, Haug U, Brenner H. American College of Physicians 2009; "Comparative evaluation of immunochemical fecal occult blood tests for colorectal adenoma detection" 150(3):162-169
3. Atkin WS, Edwards R, Kralj-Hans I, et al.: Once-only flexible sigmoidoscopy screening in prevention of colorectal cancer, Lancet 375 (9726): 1624-33, 2010
4. Brown LF, Fraser CG. Ann Clin Biochem 2008 Nov; 45(Pt6):604-5. Epub 2008 Sep 9. Effect of delay in sampling on haemoglobin determined by faecal immunochemical tests.
5. Guittet L. et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011 Jul; 20 (7): 1492-501. Epub 2011 May 16: Analytical comparison of three quantitative immunochemical fecal occult blood tests for colorectal cancer screening.